

การตรวจร่างกาย...

สามารถตรวจพบผื่นตามผิวหนัง
แรก ๆ จะขึ้นบางแห่ง ต่อมาผื่นจะลามทั่ว
ตัว ปาก ในช่องปาก ตาแดงอักเสบ และมี
ผื่นลอกเหมือนผื่นในโรค toxic epidermal
necrolysis



การพยากรณ์โรค...

อัตราการเสียชีวิตจะสูงในผู้ป่วยที่เป็นโรค toxic epidermal necrolysis
ประมาณร้อยละ 30-35



ส่วน Stevens-Johnson syndrome จะมี
อัตราการเสียชีวิตประมาณร้อยละ 5
อาจจะมีโรคแทรกซ้อน ที่สำคัญได้แก่
- การขาดน้ำและการเสียสมดุลของเกลือแร่

- การติดเชื้อ
- การสูญเสียพลังงานและโปรตีน
- ผลที่เยื่อต่างๆ เช่น ปาก ทางเดินอาหาร ทางเดินหลอดลม
- ตา อาจจะทำให้เกิดการอักเสบ และตาอาจจะบอด
- ปอดบวมพบได้ร้อยละ 30 ของผู้ป่วยที่เป็น Stevens-Johnson syndrome
- โรคแทรกซ้อนอื่นๆที่พบได้แต่ไม่มากได้แก่ ตับอักเสบ ไตวาย

การรักษา...

- หยุดปัจจัยกระตุ้น



