

แนะนำน้องใหม่



นางสาวภัทราภรณ์ สุระพร (แหม่ม)

ลืมตาโลก... 6 กุมภาพันธ์ 2528

การศึกษา... มัธยมศึกษาปีที่ 6

สถานภาพทางกาย... ไม่โสด สถานภาพทางใจ... ก็ไม่โสด

ประวัติการทำงาน... เคยเป็นลูกช่วยในเคสหนักของรพราช

อะไรคือใจให้เรามาพบกัน... โชคชะตา & บุญพระสังฆาธิ์ว้า ^_^

ความสามารถพิเศษ... ดนตรี, กีฬา

งานอดิเรก / กิจกรรมยามว่าง... ปูกล้วย - ปูกดอกไม้

ชอบ... หุ่นขี้ผึ้งที่ปั้นได้ดี

ไม่ชอบ... อะไรที่มีคนดูแล้วเศร้า

ฝันไกล ๆ ที่อยากไปให้ถึง... มีราชนิเวศน์ และครอบครัวที่มีคน

คำคมสร้างกำลังใจในการทำงาน... ความอดทนคือความสำเร็จ

อะไรก็ได้ แบบว่าอยากบอก...

พี่ๆ รพราชทุกคนน่ารัก ใจดีมากค่ะ ...ขอฝากหื้อฝากด้วยนะคะ



Drug Interaction

Drug Interaction (DI) ของ รพร.กฤษณารายณ์ ได้คัดเลือกและกำหนดไว้มี 7 คู่ยาดังนี้ โดยได้คัดเลือกจาก คู่ยา ที่มี severity ระดับ major และมักพบการส่งจ่ายในโรงพยาบาลของเรา ดังนั้นเพื่อป้องกันหรือวางแนวทาง แก้ไขผลของ Drug Interaction ของแต่ละคู่ยา เอาล่ะคะ มาดูกันว่าคู่ยาที่จัดเป็น Drug interaction ของ รพร.กฤษณารายณ์ ของเรามีอะไรบ้าง ...Let 's go....

รายการยา	คู่ DI	Effect	Management	Onset	Document.
1. Digoxin	1. Erythromycin	- ระดับยาของ Digoxin ในซีรัม เพิ่มขึ้นและอาจเกิดพิษได้	- สังเกตอาการพิษของ Digoxin (เห็นแสง วิบวับคล้ายหิ่งห้อย, การมองเห็นสีเปลี่ยน แปลง (สีแดง-สีเขียว))	Delay	Probable Suspect Probable Probable Establish
	2. Tetracyclines				
	3. HCTZ	- Electrolyte ผิดปกติ เพิ่ม			
	4. Furosemide	บ่งชี้ภัยเสี่ยงต่อ Digitalis-induce	- ควรลดขนาด Digoxin ถ้าจำเป็น		
	5. Verapamil	arrhythmias	- คอยตรวจวัดระดับ K และ Mg		

รายการยา	คู่ DI	Effect	Management	Onset	Document
2. Furosemide	1.Aminoglycoside (Genta, Streptomycin)	-พิษต่อหูเพิ่มขึ้น อาจเกิดการไม่ได้ยิน ถาวร	-ควรตรวจสอบการได้ยินก่อนให้ยาและ ระหว่างที่ใช้ -หลีกเลี่ยงการให้ยาขนาดสูงมากเกินไป ยาตัว หนึ่งหรือทั้งสอง	Rapid	Probable
3. Verapamil	1.Beta blocker (Atenolol, propranolol)	-ผลของยาทั้งสองสูง ขึ้น	-ใช้อย่างระมัดระวัง และควรวัดการทำงาน ของหัวใจถ้าพบว่าผิดปกติให้ลดขนาดยาลง	Rapid	Probable
4. Dopamine	1.Phenytoin	-ทำให้เกิดความดัน โลหิตต่ำมาก และ อาจเกิดภาวะหัวใจ หยุดเต้น	-ระมัดระวังอย่างมากที่สุดเมื่อให้ Phenytoin ในผู้ป่วยที่ได้รับ Dopamine หยุดเข้ากระแส เลือด -วัดBPของผู้ป่วย ถ้าต่ำลงต้องหยุดให้ยา Phenytoin	Rapid	Establish
5. Carbamazepine	1. Macrolide ATB (Erythro, Roxithromycin)	-เกิดความเป็นพิษ จากยา Carbamazepine	-หลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน -สังเกตอาการพิษจากยาอย่างใกล้ชิดให้หยุด ยาตัวใดตัวหนึ่งหรือลดขนาดยา Carbamazepine ตามความจำเป็น	Rapid	Establish